

使用説明書

使用前には必ず本説明書を読み、注意事項を守って使用して下さい。

劇 動物用医薬品

“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン

アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症混合
(アジュバント加) 不活化ワクチン(シード)

製法及び性状

本剤は、培養細胞で増殖させたアカバネウイルスOBE-1-KB株、カスパウイルスK-47-KB株及びアイノウイルスJaNAr28-KB株それぞれをホルマリンで不活化した後、リン酸アルミニウムゲルを加えて混合した不活化ワクチンである。

本剤は静置すると沈殿を認めるが、振盪すれば黄桃または赤桃乳白色、不透明な懸濁液となり、pHは6.8~7.4である。

成分及び分量

○液状(不活化)ワクチン 1バイアル (30mL) 中				
HmlLu-SC細胞培養アカバネウイルスOBE-1-KB株(シード)(不活化前ウイルス量)	10 ^{7.0}	TCID ₅₀ 以上		
BHK-SC細胞培養カスパウイルスK-47-KB株(シード)(不活化前ウイルス量)	10 ^{8.0}	TCID ₅₀ 以上		
HmlLu-SC細胞培養アイノウイルスJaNAr28-KB株(シード)(不活化前ウイルス量)	10 ^{7.0}	TCID ₅₀ 以上		
ホルマリン	0.03	mL以下		
りん酸三ナトリウム・12水	0.24	g		
塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物	0.15	g		
精製水		残量		

効能又は効果

牛のアカバネ病、牛のチュウザン病及びアイノウイルスによる牛の異常産の予防。

用法及び用量

牛の筋肉内に3mLずつ4週間隔で2回注射する。

使用上の注意

【一般的な注意】

- 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の处方せん・指示により使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤は効能・効果において定められた目的のみ使用すること。
- 本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」と表示されていない。

【使用者に対する注意】

誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。

本ワクチン成分の特徴

抗原	人獣共通感染症の当否	微生物の生・死	アジュバント	種類
アカバネウイルス	否	死	有	リン酸アルミニウムゲル
カスパウイルス	否	死		
アイノウイルス	否	死		

本ワクチン株は、不活化されており感染性はない。

本ワクチンに関するお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社 微生物化学研究所 営業部
〒611-0041 京都府宇治市横鳥町24、16番地
TEL : 0774-22-4519
FAX : 0774-22-4568

【牛に対する注意】

1 制限事項

- 本剤の注射前には健常状態について検査し、重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。
- 牛が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体质等を考慮し、注射の適否の判断を慎重に行うこと。
 - これまでに本剤又は他のワクチン注射により、アレルギー反応等の異常な反応を呈したことがあるもの。
 - 発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。
 - 疾病的治療が継続中のもの又は治療後間がないもの。
 - 交配後間がないもの、分娩間隔のもの又は分娩直後のもの。
 - 明らかな栄養障害があるもの。
 - 発情中又は他のワクチン注射や移動後間がないもの。
- 本剤の注射後、激しい運動は避けること。
- 本剤の注射後、少なくとも2日間は安静に努め、移動等は避けること。

2 副反応

- 過敏な体质の牛では、注射後短時間で、全身及び陰部の腫脹、元気消失、歩様踏蹠、発汗、発熱、流涙、下痢、痙攣、心悸亢進、皮膚の知覚障害、顔面の浮腫、流涎、食欲不振、起立不能及びアレルギー反応等を発現する場合もあるので、注射時の健康状態を十分に観察して注射すること。

- (2) 妊娠牛では、早産や流産・死産等を発現する場合があるので、注射時の健康状態を十分に観察して注射すること。
(3) 注射後は注意深く観察し、副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

3 相互作用

本剤には他の薬剤（ワクチン）を加えて使用しないこと。

4 適用上の注意

- (1) 注射部位（筋肉内）を厳守すること。
(2) 注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤を使用した器具は使用しないこと（ガス滅菌によるものを除く。）。なお、乾熱、高压蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。
(3) 注射器具（注射針）は1頭ごとに取り替えること。
(4) 注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。
(5) ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。
(6) ゴム栓を取り外しての使用は、雑菌が混入するおそれがあるので避けること。

【取扱い上の注意】

- (1) 外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
(2) 使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
(3) 一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。
(4) 使用時よく振り混ぜて均一とすること。
(5) 開封時にアルミキップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。
(6) ワクチン容器は破損するおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。
(7) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
(8) 使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入ること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

【保管上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
(2) 直射日光又は凍結は品質に影響を与えるので、避けること。

貯法及び有効期間

- 1 遮光して、2～10℃に保存すること。
2 有効期間は製造後2年6か月間（最終有効年月は外箱及びラベルに表示）

包 装

1バイアル 15mL (5頭分)
30mL (10頭分)

【注意事項】

- 1 遮光して、2～10℃に保存すること。
2 有効期間は製造後2年6か月間（最終有効年月は外箱及びラベルに表示）
3 1バイアル 15mL (5頭分)
30mL (10頭分)

【注意事項】

- 1 遮光して、2～10℃に保存すること。
2 有効期間は製造後2年6か月間（最終有効年月は外箱及びラベルに表示）
3 1バイアル 15mL (5頭分)
30mL (10頭分)

【成分】

成 分	原 料	の量 (g)	濃度 (%)	濃度 (%)	濃度 (%)
アシテート	水	15	15	15	15
水	水	85	85	85	85

【遮光する箇所】

- 1 本剤は遮光する箇所（外箱）に記載するように遮光する。
2 本剤は遮光する箇所（ラベル）に記載するように遮光する。
3 本剤は遮光する箇所（外箱）に記載するように遮光する。
4 本剤は遮光する箇所（ラベル）に記載するように遮光する。
5 本剤は遮光する箇所（外箱）に記載するように遮光する。
6 本剤は遮光する箇所（ラベル）に記載するように遮光する。
7 本剤は遮光する箇所（外箱）に記載するように遮光する。
8 本剤は遮光する箇所（ラベル）に記載するように遮光する。
9 本剤は遮光する箇所（外箱）に記載するように遮光する。
10 本剤は遮光する箇所（ラベル）に記載するように遮光する。

製 造 販 売 元

株式会社微生物化学研究所
京都府宇治市横島町24、16番地



26122200B

BA3V⑧