

使用前には必ず本説明書を読み、注意事項を守って使用して下さい。



動物用医薬品

“京都微研”牛嫌気性菌3種ワクチン

牛クロストリジウム感染症3種混合(アジュバント加)トキソイド(シード)

製法及び性状

本剤は、気腫菌衝繩-1株(シード)、クロストリジウム・セブチカムNo.44-1株(シード)及びクロストリジウム・ノビイCN1025-1株(シード)の3種類の菌を人工培地で増殖させた菌液をホルマリンで不活化した後、その上清を濃縮し、リン酸アルミニウムゲルを加えて調製したもので保存剤としてフェノールを0.1%添加したものである。

本剤は不透明な淡黄灰白色の液体で、静置すると灰白色の沈殿を認めるが、振盪すれば均質で不透明の液体となり、pHは6.6~7.0である。

成分及び分量

1バイアル(20mL)中	
3種混合不活化菌液50倍濃縮上清	2.0 mL
混合前沈降抗原価	
気腫菌衝繩-1株(シード)	4 単位以上
クロストリジウム・セブチカム No.44-1株(シード)	4 単位以上
クロストリジウム・ノビイ CN1025-1株(シード)	4 単位以上
ホルマリン	0.08 mL以下
りん酸三ナトリウム・12水	320.0 mg
塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物	200.0 mg
フェノール	0.02 g以下
りん酸緩衝食塩液	残量

効能又は効果

牛の気腫及び悪性水腫の予防

用法及び用量

牛の臀部筋肉内に2.0mL注射する。

使用上の注意

【一般的注意】

- 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤は効能・効果において定められた目的のみ使用すること。
- 本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」と表示されていない。

【使用者に対する注意】

- 誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。

本ワクチン成分の特徴

微生物名	抗原		アジュバント	
	人獣共通感染症の当否	微生物の生・死	有無	種類
気腫菌	否	トキソイド	有	リン酸アルミニウムゲル
クロストリジウム・セブチカム	当	トキソイド		
クロストリジウム・ノビイ(タイプB)	否	トキソイド		

本ワクチン株は、不活化されており感染性はない。

本ワクチンに関するお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社 微生物化学研究所 営業部
〒611-0041 京都府宇治市横島町24、16番地
TEL: 0774-22-4519
FAX: 0774-22-4568

- 事故防止のため、作業時には厚手の手袋等を着用すること。

【牛に対する注意】

1 制限事項

- 本剤の注射前には健康状態について検査し、重大な異常(重篤な疾病)を認めた場合は注射しないこと。
- 牛が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、注射の適否の判断を慎重に行うこと。
 - 発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。
 - 疾病の治療を継続中のもの又は治療間がないもの。
 - 交配後間がないもの、分娩間際のもの又は分娩直後のもの。
 - 明らかな栄養障害があるもの。
 - 他の薬剤投与、導入又は移動後間がないもの。
- 本剤の注射後、少なくとも2日間は安静に努め、移動等は避けること。
- 本剤の注射後、激しい運動は避けること。

- 2 副反応
副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- 3 相互作用
本剤には他の薬剤（ワクチン）を加えて使用しないこと。
- 4 適用上の注意
 - (1) 注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと（ガス滅菌によるものを除く。）。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。
 - (2) ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。
 - (3) 注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。
 - (4) 注射器具（注射針）は原則として1頭ごとに取り替えること。
 - (5) 注射部位を厳守すること。

【取扱い上の注意】

- (1) 使用時よく振り混ぜて均一とすること。
- (2) ワクチン容器は破損するおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。
- (3) 使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- (4) 外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
- (5) 開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。
- (6) 一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。
- (7) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (8) 使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

【保管上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 直射日光、加温又は凍結は本剤の品質に影響を与えるので、避けること。また、凍結すると容器が破損することがある。

貯法及び有効期間

- 1 遮光して、2～10℃に保存すること。
- 2 有効期間は製造後1年9か月間（最終有効年月は外箱及びラベルに表示）

包装

- 1 バイアル 20mL（10頭分）

【取扱い上の注意】

【保管上の注意】

成分	性状	有効成分	副成分	性状
ワクチン	白濁状	ワクチン	塩化ナトリウム	無色透明
滅菌水	透明	滅菌水	塩化ナトリウム	無色透明

【無菌ろ過】

製造販売元



株式会社 微生物化学研究所
京都府宇治市横島町24、16番地

26111800B
BCPV®